



ネオパラディグラ-A

アバナフィル 120mg+タダラフィル 25mg

【薬品構成】

有効成分: アバナフィル 120mg + タダラフィル 25mg

服用量: 医師の指示に従ってください(通常1回1錠)。

保管: 室温30°C以下の場所で保存してください。

【効能】

ネオパラディグラ-Aは男性の勃起不全を治療するための薬剤です。男性の性的機能不全の治療成分であるアバナフィルとタダラフィルを含有するステンドラとシアリスのジェネリック薬品です。ネオパラディグラ-Aの主な効能は血管を広げペニスへの血液循環の量を増加させるものであります。

【投与量と効果有効時間】

ネオパラディグラ-Aは行為の約30分前に1錠服用し、24～36時間ほどの効果が期待できます。

【注意事項】

- ・アレルギー、貧血、眼疾患、癌、高血圧や低血圧、不整脈、心不全、胸の痛み、特定の疾患などの持病をお持ちの場合は、かかりつけの医師に相談してください。
- ・副作用を悪化させる可能性があるため、薬が効いている状態で急に起き上がったり、立ち上がったりしないでください。
- ・アルコールを飲むことは効果が半減するため控えてください。
- ・すでに別のED薬を服用した場合、ネオパラディグラ-Aの服用はしないでください。
- ・アルプロスタジル(Caverject, ミューズ、EDEX)またはヨヒンビン(Yocon, Yodoxin、他)をネオパラディグラ-Aと併用する場合は使用前に医師に相談することをお勧めいたします。

【ネオパラディグラ-Aの併用禁忌薬】

ネオパラディグラ-Aはニトログリセリンとの併用が禁忌とされています。バイアグラとニトログリセリンは、どちらも血管を拡張させる作用があることから、血圧の低下をもたらします。血圧が低下しすぎると、最悪生命に危険を引き起こすことになります。また18歳以下の方は、この薬を服用しないでください。

【薬物相互作用】

ネオパラディグラ-Aは、有機硝酸塩が含まれている薬物療法で治療している患者に対しての処方は医師からされてはおりません。ネオパラディグラ-Aの血中濃度は、エリスロマイシン、ケトコナゾール、イトラコナゾールおよびサキナビルなどの影響により上昇いたします。これらの薬はネオパラディグラ-Aとの相互作用があることが知られています。

【過剰摂取】

ネオパラディグラ-Aを過剰摂取した場合、失神、胸痛、吐き気、不規則な心拍、立ちくらみが発生することがあります。その場合は使用を止め、直ちに医師の診断を受けてください。

【保管方法】

湿気、日光をさけ、子供やペットの届かないところに置き、常温で保管してください。

Neo Paladigra - A

Avanafil 120mg + Tadalafil 25mg

【Composition】

Tablet contains: Avanafil 120mg + Tadalafil 25mg

Dosage: As directed by the Physician

Storage: Store at a temperature below 30°C

【Common use】

NeoPaladigra-A dose effects in 30 minutes and last during 24～36 hours.

【Precautions】

- Before to take NeoPaladigra-A notify your doctor if you suffer from allergies, anemia, eye diseases, cancer, high blood pressure or low blood pressure, irregular heart rhythm, heart failure, unstable chest pain, certain eye disorders, deformation of the penis or have history of such conditions or take protease inhibitors for the treatment of HIV.
- Do not stand up fast from a lying or sitting position.
- Avoid drinking alcohol as it may worsen side effects.
- Do not take NeoPaladigra-A if you have already taken another ED medication.
- Warn your doctor before to take NeoPaladigra-A if you use alprostadil (Caverject, Muse, Edex) or yohimbine (Yocon, Yodoxin, others).

【Contraindications】

NeoPaladigra-A is contraindicated in patients with allergy to the medication or those who are treated with nitrates (such as nitroglycerin). This combination can result in very low blood pressure that can lead to a stroke, a heart attack, or death. Do not take this medication if you are under 18 y.o.

【Possible side effects】

Some patients may experience headache, diarrhea, dizziness, upset stomach, vomiting, nasal congestion. Such adverse effect like face blushing may be less expressed than in individuals taking Viagra. NeoPaladigra-A can cause a rare but serious condition known as priapism or prolonged erection. Contact your health care provider at once if your erection continues longer than for hours.

【Drug interactions】

NeoPaladigra-A should not be prescribed to patients treated with medications which contain organic nitrates.

NeoPaladigra-A blood levels are raised by erythromycin, ketoconazole, itraconazole and saquinavir. These medications are known to interact with NeoPaladigra-A.

【Overdose】

If you overdosed NeoPaladigra-A you may experience fainting, chest pain, nausea, irregular heartbeat, lightheadedness. Seek for immediate medical help if so.

【Storage】

Store at room temperature away from moisture, sunlight, kids and pets in a tight container.